

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 27-8-71 205370

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG
Tél. 34-14-63 - Poste 93

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F
Régisseur de recettes D.D.A.
2, Rue des Mineurs
67 - STRASBOURG

Supplément n° 3 au Bulletin n° 131 du mois d'Août 1971

24 Août 1971

GRANDES CULTURES

HOUBLON

MILDIOU

Les dernières pluies orageuses sont favorables au développement du Mildiou sur cônes.

Ainsi, une nouvelle application fongicide devra être réalisée dès réception de la présente Note.

Nous précisons que pour éviter la coloration des cônes par les produits cupriques, il est conseillé de porter son choix sur des organiques de synthèse.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les contrôles des vols de papillons de 2ème génération, effectués par pièges lumineux et par pièges alimentaires, permettent de noter une reprise d'activité de cet insecte.

Etant donné que les conditions crépusculaires de température et d'hygrométrie restent propices aux pontes, notamment dans les expositions chaudes, il est recommandé d'exécuter un dernier traitement contre le Carpocapse dans la période du 26 au 28 Août.

Ce traitement est d'autant plus important que les récentes averses orageuses ont fortement diminué l'efficacité du dernier traitement insecticide conseillé le 3 Août.

Pour le choix du produit, respecter la législation relative aux délais d'emploi des produits avant la récolte.

CULTURES MARAÎCHÈRES

TOMATE

MILDIOU

Les conditions climatiques actuelles sont particulièrement favorables au développement du Mildiou de la tomate. Traiter, dès que possible, avec l'un des produits suivants : Mancozèbe : 160 g/hl ; Manèbe : 160 g/hl ; Propinèbe : 210 g/hl.

.../...

146

CELERI

SEPTORIOSE

Cette maladie se manifeste avec une certaine intensité dans les parcelles insuffisamment protégées. Surveiller attentivement l'évolution des taches sur les feuilles et poursuivre les traitements fongicides en utilisant l'un des produits conseillés dans notre Bulletin n° 128 du 7 Mai 1971.

POIREAU

TEIGNE

Une recrudescence des vols de ce papillon est notée et des attaques sont à craindre pour la fin de ce mois.

Un nouveau traitement insecticide devra être réalisé au cours des prochains jours.

Utiliser un produit à base de :

- | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| - Diazinon | : 25 g de M.A./hl. | - Lindane | : 30 g de M.A./hl. |
| - Malathion | : 75 g " | - Parathion éthyl | : 25 g " |
| - Parathion méthyl | : 40 g " | | |

Ajouter un mouillant à la bouillie.

Complément à notre Note du 17 Août 1971 concernant le désherbage du colza d'hiver avant la levée.

Les herbicides à appliquer avant le semis.

Nous signalons qu'en dehors des produits recommandés dans cette Note, il y a lieu d'ajouter :

CYCLOATE (Ro-neet) produit uniquement anti-graminées. Il s'utilise à la dose de 2.880 g de matière active à l'hectare.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles :
C. GACHON et Ch. JANUS.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux :
J. HARRANGER.

Dernière Note parue : Supplément n° 2 au Bulletin n° 131 du mois d'Août 1971.